

Allegato 4

Indicazioni per il riconoscimento dei segni dell'organismo nocivo.

I segni/sintomi di *Anoplophora glabripennis* Motschulsky sono rilevabili sugli organi legnosi con diametro maggiore di 1 cm. Sulle piante ospiti, in genere, i segni/sintomi dell'attacco si possono evidenziare nella porzione medio-alta del fusto e/o sui rami. In qualche caso può essere interessata anche la parte basale del tronco.

- Sugli organi legnosi è possibile rilevare:
 - la nicchia di ovideposizione di forma rotondeggiante leggermente schiacciata ai poli. sulle porzioni di ramo e/o fusto interessate dall'attacco è possibile notare una o più nicchie;
 - all'interno della nicchia è possibile trovare l'uovo di colore bianco con forma lenticolare simile ad un chicco di riso;
 - gallerie negli organi legnosi con andamento orizzontale all'inizio e poi scavate in profondità;
 - larve apode di colore biancastro con capo nero che vivono sempre all'interno del legno. A maturità possono raggiungere 5 cm di lunghezza;
 - rosura da attività larvale sui rami o alla base del tronco;
 - essudati che possono verificarsi in corrispondenza delle nicchie di ovideposizione sui rami e/o sul tronco della pianta attaccata;
 - fori sfarfallamento degli adulti con forma rotonda, regolare del diametro di circa 1 cm;
 - adulto con lunghe antenne articolate con bande nere e grigio-bluestre, tegumento di colore nero lucido con macchie bianche irregolari sulle elitre. Lunghezza variabile tra 2-3,5 cm.;
 - disseccamenti della chioma della pianta o parte di essa.
- Il controllo fitosanitario riguarda tutte le piante specificate di ogni lotto in coltivazione. Nel periodo autunno-invernale è più facile osservare i segni/sintomi dell'attacco dell'organismo nocivo per assenza di vegetazione dell'anno.
- In presenza di rosure, gallerie, larve, adulti o di ogni altro segno/sintomo sospetto dell'organismo nocivo allertare immediatamente il SFR.