

PESCO SLAPI

Prunus persica L. Batsch

N° REPERTORIO: 127
inserita il 19.12.2019

FAMIGLIA: Rosaceae

GENERE: *Prunus*

SPECIE: *P. persica*

NOME COMUNE: Slapi

RISCHIO DI EROSIONE:
Alto

AREA AUTOCTONA
DI DIFFUSIONE:
Comune di Colli
al Metauro - PU

LUOGO DI
CONSERVAZIONE:
Campo germoplasma
frutticolo AMAP - Carassai
(AP)



CENNI STORICI ED AREA DI DIFFUSIONE

L'area di origine corrisponde al comune di Colli al Metauro dove è ubicata l'azienda agricola dei Fratelli Boni. Questa varietà viene coltivata dalla famiglia Boni almeno da 5 generazioni per cui si arriva a ritroso nel tempo con certezza alla fine del 1800, tale varietà veniva utilizzata insieme al susino FORMICHINE ed al pero come intermezzo nei filari di vite maritata con acero nella tipica coltivazione dei filari alberati utilizzata nelle campagne delle Marche. I filari erano distanti 12 metri gli uni dagli altri, gli aceri lungo la fila con distanza di impianto a 12 metri intervallati con un albero da frutta, le viti completavano il filare. L'interfila veniva utilizzata per le coltivazioni erbacee ed orticole dell'azienda.

Attualmente tale varietà è diffusa solo nel comune di Colli al Metauro.

DESCRIZIONE BIO-MORFOLOGICA

ALBERO

Di media vigoria, portamento espanso, chioma folta ben sviluppata.

Fruttificazione prevalente su rami misti e brindilli. Pianta rustica con ampia adattabilità pedo-climatica.

FOGLIA

Di medie dimensioni, forma lanceolata di colore verde intenso nella pagina superiore, più chiaro nella pagina inferiore, con glandole fogliari presenti e reniformi.

FIORI

Di tipo campanulaceo, con petali di colore rosa. L'epoca di fioritura è intermedia, di elevata entità, autocompatibile.

FRUTTO

La forma del frutto è ovata, con umbone molto evidente, di medie dimensioni, colore di fondo giallo-verde, con presenza di sovracolore rosso sul 20-25 % a completa maturazione.

CARATTERI DELLA POLPA

La polpa del frutto è gialla, spicca o semiaderente. La tessitura è fibrosa, consistenza media, che tende a intenerire velocemente durante la maturazione, scarsa



tenuta alle manipolazioni, ottimi gli aromi ed il sapore, il gusto è equilibrato la polpa è succosa.
L'endocarpo è di medie dimensioni di forma ellittica e colore marrone.

FENOLOGIA

L'epoca di germogliamento e di fioritura sono medie.
L'epoca di maturazione è intermedia, il frutto matura generalmente tra metà e fine luglio.
La maturazione è scalare, necessita di più stacchi per uniformare la produzione.

PRODUTTIVITÀ

Generalmente la pianta è molto produttiva e necessita di diradamento accurato per mantenere la pezzatura.

SUSCETTIBILITÀ O RESISTENZA A FITOPATIE

Non si evidenziano particolari resistenze a bolla ed oidio.

Custode Biodiversità Agraria:

Azienda Società Agricola Fratelli Boni s.s. - Colli al Metauro (PU)

Scheda elaborata da:

Franco Capocasa - UNIVPM - D3A - area scientifica di Frutticoltura

Gianni Malavolta - ASSAM



